

PRODUCT INFORMATION

製品名: ペルオキシダーゼ標識抗 Cry j 1 モノクローナル抗体 053
コード No.: HBL-Ab-1-053P
サイズ: 25 µg, 100 µl/vial (250 µg/ml, : 分子吸光係数より算出)

内容

抗 Cry j 1 モノクローナル抗体 053(マウス IgG1, κ)に西洋ワサビ由来ペルオキシダーゼを標識したもの。

特異性

スギ(*Cryptomeria japonica*)花粉の Cry j 1 抗原を特異的に認識する。Cry j 2 抗原との交差反応性は 0.1%以下。

溶媒: 1% ウシ血清アルブミンを含む PBS (安定化剤、防腐剤不含)

使用及び保存方法


-20°C以下で遮光・凍結保存する。凍結融解の繰り返しは不可。

用途

Cry j 1-ELISA の場合、1 : 1000 に希釀して使用する。希釀液は不安定であるため、使用時に必要量を希釀・調製する。

参考文献

- Kawashima, T. et al.:Antigenic analysis of Sugi basic protein by monoclonal antibodies:I. Distribution and characterization of B-cell-tropic epitopes of *Cry j I* molecules. *Int. Arch. Allergy Immunol.*, 98(2), 110-117, 1992
- Kawashima, T. et al.:Antigenic analysis of Sugi basic protein by monoclonal antibodies:II. Detection of immunoreactive fragments in enzyme-cleaved *Cry j I*. *Int. Arch. Allergy Immunol.*, 98(2), 118-126, 1992



本品を用いて得られた
Cry j 1-ELISA の検量線

本品および抗 Cry j 1 モノクローナル抗体 013 (#HBL-Ab-1-013)、精製 Cry j 1 (#HBL-C-1) を用いてサンンドイッチ ELISA を行い、検量線を得た。

注) 本品は研究用であり、治療用または診断用に使用しないこと。

PRODUCT INFORMATION

Product Name: Peroxidase conjugated anti-Cry j 1 mAb 053

Code No.: HBL-Ab-1-053P

Size: 25 µg, 100 µl/vial (Frozen Liquid)

This product is for research use only

Specification and Use

Specificity :

This peroxidase-conjugated antibody recognizes Cry j 1 antigen (Japanese cedar pollen allergen). This antibody cross-reacts against Cry j 2 antigen less than 0.1%.

Isotype :

Mouse monoclonal antibody IgG1,κ

Preparation & form :

The hybridoma was inoculated in mice intraperitoneally. IgG was purified from collected ascites by ProteinG Sepharose column chromatography. Then IgG was conjugated with horseradish peroxidase by periodide method.

Peroxidase conjugated IgG was prepared in the concentration of 250µg/ml with phosphate-buffered saline containing 1 % bovine serum albumin fractionV.

Storage :

Store below -20°C in the dark. Avoid multiple freeze/thaw cycles by storage in appropriate aliquots.

Applications:

This antibody is suitable for enzyme-linked immunosorbent assay. Dilute 1:1000 as a detect antibody.

References :

- Kawashima, T. et al.:Antigenic analysis of Sugi basic protein by monoclonal antibodies:I. Distribution and characterization of B-cell-tropic epitopes of *Cry j I* molecules. *Int. Arch. Allergy Immunol.*, 98(2), 110-117, 1992
- Kawashima, T. et al.:Antigenic analysis of Sugi basic protein by monoclonal antibodies:II. Detection of immunoreactive fragments in enzyme-cleaved *Cry j I*. *Int. Arch. Allergy Immunol.*, 98(2), 118-126, 1992

Caution ! :

This material is research use only, not for clinical or diagnostic use.